Diagnostic et prise en charge des
Maladies d'Alzheimer et Apparentées

Imagerie morphologique de la MA en pratique clinique

Dr Grégory Kuchcinski

gregory.kuchcinski@univ-lille.fr

Service de Neuroradiologie, CHU de Lille

22/11/2019

Liens d'intérêt

➤ Aucun

Objectifs pédagogiques

- Connaître les modifications morphologiques liées à la MA
- Savoir lire une IRM/TDM pour une suspicion de MA
- Savoir utiliser les échelles visuelles de Scheltens et Fazekas

Maladie d'Alzheimer: quels biomarqueurs IRM ?

Accumulation B amyloïde

Dégénérescence neurofibrillaire

Dysfonction synaptique / Hypométabolisme

Anomalies de perfusion cérébrale

Neurodégénérescence

Maladie d'Alzheimer: quels biomarqueurs IRM ?

Accumulation B amyloïde

Dégénérescence neurofibrillaire

Dysfonction synaptique / Hypométabolisme

Anomalies de perfusion cérébrale

Neurodégénérescence

Atrophie cérébrale

Diagnostic MA

Atrophie cérébrale

Diagnostic MA

- 1 an

- 2 ans

Atrophie cérébrale

Evolution classique:

1. Hippocampe / Cortex entorhinal / Gyrus fusiforme / G>D
2. Lobe temporal médian et inférieur
3. Cortex associatif temporo-pariétal et frontal

Diagnostic MA

- 1 an

- 2 ans

Atrophie cérébrale

Evolution classique:

1. Hippocampe / Cortex entorhinal / Gyrus fusiforme / G>D
2. Lobe temporal médian et inférieur
3. Cortex associatif temporo-pariétal et frontal

Diagnostic MA

- 1 an

- 2 ans

Atrophie cérébrale

Control vs hippocampal-sparing AD

Control vs typical AD

Control vs limbic-predominant AD

4 patterns d'atrophie ont été décrits :

- Typique
- Limbique prédominant
- Epargnant l'hippocampe
- Atrophie minime

Atrophie cérébrale

Control vs hippocampal-sparing AD

Control vs typical AD

Control vs limbic-predominant AD

4 patterns d'atrophie ont été décrits :

- **Typique (70%)**
- Limbique prédominant
- Epargnant l'hippocampe
- Atrophie minime

Atrophie cérébrale

Control vs hippocampal-sparing AD

Control vs typical AD

Control vs limbic-predominant AD

4 patterns d'atrophie ont été décrits :

- Typique
- **Limbique prédominant (15%)**
- Epargnant l'hippocampe
- Atrophie minime

Atrophie cérébrale

Control vs hippocampal-sparing AD

Control vs typical AD

Control vs limbic-predominant AD

4 patterns d'atrophie ont été décrits :

- Typique
- Limbique prédominant
- **Epargnant l'hippocampe (15%)**
- Atrophie minime

Atrophie cérébrale

Control vs hippocampal-sparing AD

Control vs typical AD

Control vs limbic-predominant AD

4 patterns d'atrophie ont été décrits :

- Typique
- Limbique prédominant
- Epargnant l'hippocampe
- **Atrophie minime**

Atrophie cérébrale en pratique

Séquence 3D T1 EG

Axial

Coronal

Sagittal

Avantages

Résolution spatiale (1 mm)

Reconstructions multiplanaires

Informations

Atrophie hippocampique (Scheltens)

Pattern atrophie corticale

Volume ventriculaire

Atrophie hippocampique en pratique

- Volume hippocampique inférieur de 30% dans la MA (vs contrôles)

Fouquet 2007

- Sensibilité et spécificité > 80%

Lehéricy 2008

- Vitesse d'atrophie: 4% /an (contre 1% chez les contrôles)

Jack 2000

- Corrélation aux performances cognitives

Sarrazin 2010

- Prédicatif de conversion MCI => MA

Costafreda 2011

Atrophie hippocampique en pratique

Atrophie hippocampique en pratique

Atrophie hippocampique en pratique

Atrophie hippocampique en pratique

Atrophie hippocampique en pratique

Atrophie hippocampique en pratique

Atrophie hippocampique en pratique

Atrophie hippocampique en pratique

Echelle visuelle de Scheltens

Score	Largeur Fissure Choroïdienne	Largeur Corne Temporale	Hauteur Hippocampe
0	N	N	N
1	↑	N	N
2	↑↑	↑	↓
3	↑↑↑	↑↑	↓↓
4	↑↑↑	↑↑↑	↓↓↓

Atrophie hippocampique en pratique

Atrophie hippocampique en pratique

Scheltens 4

Scheltens 4

Scheltens 3

Scheltens 3

Scheltens 4

Scheltens 2

Scheltens 2

Scheltens 1

Atrophie hippocampique en pratique

Echelle visuelle de Scheltens

Corrélation imparfaite avec le volume hippocampique ($r=-0,36;-0,50$)

Boutet Neuroradiology 2012

Variabilité inter et intra observateur ($\kappa=0,45-0,74$)

Boutet Neuroradiology 2012

Non spécifique:

- Démence vasculaire
- DLFT
- Démence à corps de Lewy

Atrophie hippocampique en pratique

Enkirch Radiology 2018

Evaluation cortex entorhinal > hippocampe
Sillon collatéral / Espace avec la tente du cervelet

Atrophie corticale en pratique

Sujet sain

MA

Atrophie corticale en pratique

Sujet sain

MA

Atrophie corticale en pratique

Evaluation qualitative de l'atrophie:

- Absente
- Discrète = élargissement des sillons
- Modérée = perte de volume des gyri
- Sévère = atrophie en lame de couteau

Pasquier Eur Neurol 1997

Atrophie corticale en pratique

Contrôle

MA

Atrophie corticale en pratique

Contrôle

MA

Gradient antéro-postérieur

Symétrie

Atrophie corticale en pratique

Atrophie corticale en pratique

Sillon calloso-marginal

Sillon pariéto-occipital

Atrophie corticale en pratique

Sillon calloso-marginal

Précunéus

Sillon pariéto-occipital

Atrophie corticale en pratique

Contrôle

MA

Atrophie corticale en pratique

Contrôle

MA

Gradient antéro-postérieur

Atrophie corticale: évaluation longitudinale

Taux d'atrophie discrimine AD/MCI/HC
HC = -1% par an / AD = -4% par an

Lésions associées

Anatomo-pathologie
Angiopathie amyloïde
chez 80% des patients avec MA

Lésions associées

Hypersignaux de la SB

Dilatation des EVR

Microbleeds

Anatomo-pathologie
Angiopathie amyloïde
chez 80% des patients avec MA

Microinfarctus

Hypersignaux de la substance blanche

Volume des hypersignaux plus élevé dans MA
CAA > AD > sujets sains

Mais même pattern topographique =
Zones physiologiquement hypoperfusées

Volume inversement corrélé aux performances
cognitives

Hypersignaux de la substance blanche

Formes génétiques

Augmentation WMH vs contrôles

Atteinte occipitale et pariétale plus précoce

22 ans et 8 ans avant le début des symptômes

Hypersignaux de la substance blanche

Formes génétiques

Augmentation WMH vs contrôles

Atteinte occipitale et pariétale plus précoce

22 ans et 8 ans avant le début des symptômes

Hypersignaux de la substance blanche

McAleese Acta Neuropathol 2017

Brickman Alzheimer Dementia 2014

WMH en IRM pré-mortem => lésions anapath de MA
=> Déclin cognitif

Alosco J Alz Disease 2018

WMH lobe pariétal => tauopathie corticale

McAleese Acta Neuropathol 2017

ApoE4 => WMH lobe pariétal

Brickman Alz Dem 2014

ApoE4 => progression des WMH

Sudre Neurobiol Aging 2017

WMH pariétale => conversion MCI/AD

Brickman Neurobiol Aging 2015

Hypersignaux de la substance blanche en pratique

Score de Fazekas
Leucopathie

0

I

II

III

Substance blanche
périventriculaire

Substance blanche
profonde

Hypersignaux de la substance blanche en pratique

Score de Fazekas
Leucopathie

0

I

II

III

Substance blanche
périventriculaire

Substance blanche
profonde

Hypersignaux de la substance blanche en pratique

Score de Fazekas
Leucopathie

Substance blanche
périventriculaire

Substance blanche
profonde

Microhémorragies et MA

Plus fréquent qu'en population générale (19-28%)

Sepehry AJNR 2016

Prédominance occipitale

Lobaire

Corrélié aux WMH

Pettersen Arch Neurol 2008

Microhémorragies en pratique

Avantages

Sensibilité à l'hémorragie
= artéfact de susceptibilité
= hyposignal

SWI > T2*

Sensibilité
Résolution spatiale
Différentiation microhémorragie /
microcalcification

SWI < T2*

Temps d'acquisition
Artéfacts de mouvements

Microhémorragies en pratique

Microhémorragie / Microbleed
Hyposignal franc en T2*/SWI

Focal, arrondi, < 5 mm

Sans traduction sur les autres
séquences

≠ structure vasculaire, calcifications
pallidales

Microhémorragies en pratique

Microhémorragie / Microbleed
Hyposignal franc en T2*/SWI

Focal, arrondi, < 5 mm

Sans traduction sur les autres
séquences

≠ structure vasculaire, calcifications
pallidales

Microhémorragies en pratique

Lobar
■ cortex
▨ sub-cortical white matter

Deep
▩ caudate, lentiform, thalamus
▧ Internal, external capsules

Microhémorragies en pratique

Microhémorragies lobaires

Hémosidérose corticale superficielle

Séquelle d'hématome lobaire

Angiopathie amyloïde

Microhémorragies en pratique

Lacunes

Leucopathie vasculaire

Microhémorragies profondes

Microangiopathie hypertensive

Microhémorragies en pratique

Impact clinique

La présence et le nombre de microbleeds:

- sont associés à un risque plus élevé de **démence** en population générale

Akoudad JAMA Neurol 2016

- ne modifient pas le **déclin cognitif** dans la MA

van der Vlies Neurology 2012

- sont associés à la **charge amyloïde** en TEP (microbleeds lobaires)

Park Ann Neurol 2013

- sont associés à un taux plus faible de **AB42** et un taux plus élevé de **phospho-tau** dans le **LCS** (microbleeds lobaires)

Chiang AJNR 2015

- sont associés à une **surmortalité par AVC** (microbleeds lobaires)

- sont associés à une **surmortalité cardiovasculaire** (microbleeds profonds)

Benedictus JAMA Neurol 2015

Dilatation des espaces péri-vasculaires et MA

Kwee Radiographics 2007

Localisation

- Type I = Artères lenticulo-striées
- Type II = Artères médullaires perforantes
- Type III = Mésencéphale

Dilatation des espaces péri-vasculaires et MA

Grade élevé
Centres semi-ovales
=
MA

Grade élevé
Noyaux gris
=
SVD

Micro-infarctus en pratiques

Hypersignal DWI **punctiforme** (ADC normal ou diminué)

Prévalence = **4-5%** dans une population âgée

Auriel Stroke 2015

Partie émergée de l'iceberg:

1 hypersignal DWI = **100** microinfarctus en anatomopathologie

Auriel Stroke 2015

Association avec **déclin cognitif**

Smith Lancet Neurol 2012

Cas illustratifs

Femme 71 ans, Surpoids

Troubles cognitifs légers, dysexécutifs et de mémoire de travail, rapportés à une composante émotionnelle.

Test de MOCA tout à fait rassurant à 28/30

Cas illustratifs

Femme 71 ans, Surpoids

Troubles cognitifs légers, dysexécutifs et de mémoire de travail, rapportés à une composante émotionnelle.

Test de MOCA tout à fait rassurant à 28/30

Cas illustratifs

Femme 71 ans, Surpoids

Troubles cognitifs légers, dysexécutifs et de mémoire de travail, rapportés à une composante émotionnelle.

Test de MOCA tout à fait rassurant à 28/30

Cas illustratifs

Femme 71 ans, Surpoids

Troubles cognitifs légers, dysexécutifs et de mémoire de travail, rapportés à une composante émotionnelle.

Test de MOCA tout à fait rassurant à 28/30

Cas illustratifs

Femme 56 ans

ATCD: syndrome dépressif, ATCD familiaux : troubles mnésiques non étiquetés chez la mère. Les

FdR: HTA depuis 15 ans, dyslipidémie

En 2007, bilan neuropsychologique: dysfonctionnement exécutif en rapport avec un syndrome anxio-dépressif

En 2009, les troubles mnésiques se sont aggravés. Le profil reste d'allure principalement fronto sous cortical

Le score au MMS est à 22/30. La BREF est à 14/18 . L'IADL est à 4/8

Cas illustratifs

Femme 56 ans

ATCD: syndrome dépressif, ATCD familiaux : troubles mnésiques non étiquetés chez la mère. Les

FdR: HTA depuis 15 ans, dyslipidémie

En 2007, bilan neuropsychologique: dysfonctionnement exécutif en rapport avec un syndrome anxio-dépressif

En 2009, les troubles mnésiques se sont aggravés. Le profil reste d'allure principalement fronto sous cortical

Le score au MMS est à 22/30. La BREF est à 14/18 . L'IADL est à 4/8

Cas illustratifs

Femme 56 ans

ATCD: syndrome dépressif, ATCD familiaux : troubles mnésiques non étiquetés chez la mère. Les

FdR: HTA depuis 15 ans, dyslipidémie

En 2007, bilan neuropsychologique: dysfonctionnement exécutif en rapport avec un syndrome anxio-dépressif

En 2009, les troubles mnésiques se sont aggravés. Le profil reste d'allure principalement fronto sous cortical

Le score au MMS est à 22/30. La BREF est à 14/18 . L'IADL est à 4/8

Cas illustratifs

Femme 56 ans

ATCD: syndrome dépressif, ATCD familiaux : troubles mnésiques non étiquetés chez la mère. Les

FdR: HTA depuis 15 ans, dyslipidémie

En 2007, bilan neuropsychologique: dysfonctionnement exécutif en rapport avec un syndrome anxio-dépressif

En 2009, les troubles mnésiques se sont aggravés. Le profil reste d'allure principalement fronto sous cortical

Le score au MMS est à 22/30. La BREF est à 14/18 . L'IADL est à 4/8

Cas illustratifs

Femme 56 ans

ATCD: syndrome dépressif, ATCD familiaux : troubles mnésiques non étiquetés chez la mère. Les

FdR: HTA depuis 15 ans, dyslipidémie

En 2007, bilan neuropsychologique: dysfonctionnement exécutif en rapport avec un syndrome anxio-dépressif

En 2009, les troubles mnésiques se sont aggravés. Le profil reste d'allure principalement fronto sous cortical

Le score au MMS est à 22/30. La BREF est à 14/18 . L'IADL est à 4/8

Cas illustratifs

Femme 56 ans

ATCD: syndrome dépressif, ATCD familiaux : troubles mnésiques non étiquetés chez la mère. Les

FdR: HTA depuis 15 ans, dyslipidémie

En 2007, bilan neuropsychologique: dysfonctionnement exécutif en rapport avec un syndrome anxio-dépressif

En 2009, les troubles mnésiques se sont aggravés. Le profil reste d'allure principalement fronto sous cortical

Le score au MMS est à 22/30. La BREF est à 14/18 . L'IADL est à 4/8

Ponction lombaire = profil évocateur d'une maladie d'Alzheimer:

TAU à 410 picogrammes /litre

Phospho-TAU à 72 picogrammes /litre

A-bêta 42 à 269 picogrammes/litre

L'index IATI à 0,37

Cas illustratifs

Femme de 62 ans

FdR: Dyslipidémie/ Antécédents familiaux : Mère ayant présentée une maladie d'Alzheimer à l'âge de 80 ans

HdM: Depuis 2 ans , troubles mnésiques (perte d'objets, atteinte de la mémoire des faits récents) + troubles psychocomportementaux (irritabilité).

Altération de la mémoire épisodique verbale ++, des fonctions exécutives, de l'orientation

IADL = 3/8, MMS = 18/30, BREF : 12/18.

Cas illustratifs

Femme de 62 ans

FdR: Dyslipidémie/ Antécédents familiaux : Mère ayant présentée une maladie d'Alzheimer à l'âge de 80 ans

HdM: Depuis 2 ans , troubles mnésiques (perte d'objets, atteinte de la mémoire des faits récents) + troubles psychocomportementaux (irritabilité).

Altération de la mémoire épisodique verbale ++, des fonctions exécutives, de l'orientation

IADL = 3/8, MMS = 18/30, BREF : 12/18.

Cas illustratifs

Femme de 62 ans

FdR: Dyslipidémie/ Antécédents familiaux : Mère ayant présentée une maladie d'Alzheimer à l'âge de 80 ans

HdM: Depuis 2 ans , troubles mnésiques (perte d'objets, atteinte de la mémoire des faits récents) + troubles psychocomportementaux (irritabilité).

Altération de la mémoire épisodique verbale ++, des fonctions exécutives, de l'orientation

IADL = 3/8, MMS = 18/30, BREF : 12/18.

Cas illustratifs

Femme de 62 ans

FdR: Dyslipidémie/ Antécédents familiaux : Mère ayant présentée une maladie d'Alzheimer à l'âge de 80 ans

HdM: Depuis 2 ans , troubles mnésiques (perte d'objets, atteinte de la mémoire des faits récents) + troubles psychocomportementaux (irritabilité).

Altération de la mémoire épisodique verbale ++, des fonctions exécutives, de l'orientation

IADL = 3/8, MMS = 18/30, BREF : 12/18.

Cas illustratifs

Femme de 62 ans

FdR: Dyslipidémie/ Antécédents familiaux : Mère ayant présentée une maladie d'Alzheimer à l'âge de 80 ans

HdM: Depuis 2 ans , troubles mnésiques (perte d'objets, atteinte de la mémoire des faits récents) + troubles psychocomportementaux (irritabilité).

Altération de la mémoire épisodique verbale ++, des fonctions exécutives, de l'orientation

IADL = 3/8, MMS = 18/30, BREF : 12/18.

2017

MMS=19 / BREF = 15

2018

MMS=20 / BREF=13

2019

MMS=16 / BREF=10

Ce qu'il faut retenir...

- IRM systématiquement indiquée
- Protocole adapté / lecture systématique:

3DT1	Atrophie hippocampique (Scheltens), pattern atrophie corticale, espaces de Virchow-Robin
FLAIR	Hypersignaux de la SB pariétale
T2*/SWI	Microhémorragies
DWI	Microinfarctus, Creutzfeldt-Jakob

3 objectifs

1. Eliminer une cause curable
2. Evaluer les lésions vasculaires
3. Identifier un pattern évocateur

- Pattern évocateur mais **non spécifique**
=> intégration **multidisciplinaire**

Références-clefs

- Colliot O, Hamelin L, Sarazin M. Magnetic resonance imaging for diagnosis of early Alzheimer's disease. *Rev Neurol (Paris)*. 2013 Oct;169(10):724-8. doi:10.1016/j.neurol.2013.07.013. Epub 2013 Sep 4. Review. French
- Trombella S, Assal F, Zekry D et al. [Brain imaging of Alzheimer' disease: state of the art and perspectives for clinicians]. *Rev Med Suisse*. 2016 Apr 20;12(515):795-8. Review. French.
- Jagust W. Imaging the evolution and pathophysiology of Alzheimer disease. *Nat Rev Neurosci*. 2018 Nov;19(11):687-700. doi: 10.1038/s41583-018-0067-3.
- Fazekas F, Chawluk JB, Alavi A, Hurtig HI, Zimmerman RA. MR signal abnormalities at 1.5 T in Alzheimer's dementia and normal aging. *AJR Am J Roentgenol* 1987 ; 149 : 351-6.
- Scheltens P, Leys D, Barkhof F et al. Atrophy of medial temporal lobes on MRI in 'probable' Alzheimer's disease and normal ageing: diagnostic value and neuropsychological correlates . *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1992. ; 55 : 967 – 72 .

Remerciements:

A toute l'équipe du Service de Neuroradiologie du CHU de Lille

CMRR du CHU de Lille

Plateforme d'imagerie du vivant, Université de Lille – www.ci2c.fr

Toute exploitation, diffusion, reproduction, modification ou réédition de tout ou partie de ce document sur un support électronique ou papier quel qu'il soit est formellement interdite, sauf autorisation expresse de l'enseignant-auteur. Toute utilisation non autorisée par l'enseignant-auteur est constitutive de contrefaçon pénalement sanctionnée au titre de la législation afférente à la propriété intellectuelle (articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). Seule la copie à usage privé est autorisée ; par copie privée, il convient d'entendre un usage licite, privé et non commercial d'un ou de plusieurs éléments du document à destination d'un ordinateur ou de tout autre support strictement personnel.